

lue le 30 may, 1765

Marrigues.

Q

no. 41 Observation

sur une tumeur enkistée, au doigt médian. dont les matières avoient leur foyer sous la gaine des tendons flechisseurs. avec quelques remarques sur la nature de ces matières.



Au mois de novembre 1758 un frotteur du château de Versailles, en tirant précipitamment d'une main, la corde d'une grosse lanterne, pour la faire remonter; se froissa violemment la partie interne du doigt médian de la main gauche, depuis son articulation avec l'os du métacarpe, — jusques presque le milieu de la seconde phalange. Les premiers symptômes qui suivirent ce froissement, furent une grande douleur tout le long de ce doigt, et une enflure subite à l'endroit où l'impression avoit été plus vive. Cette impression, qui avoit sans doute porté son effet jusqu'aux tendons flechisseurs cachés sous la gaine, et conséquemment au delà de cette gaine, avoit vraisemblablement portée aussi son action jusqu'au ligament articulaire puisque la douleur paroissoit plus marquée en ces endroits, et

ARC41 n° 129

et occasionné la dilaceration intérieure et la rupture des
petits vaisseaux lymphatiques destinés à charrier la fièvre, par
la meurtrissure et la contusion ; néanmoins, il n'y avoit
aucune érosion à la peau ; la dureté et le raccourcissement
de l'épiderme à l'endroit contus paroissent l'en avoir
garantie.

Cette blessure quoique fort douloureuse dans les premiers
instans, ne fixa pourtant pas trop l'attention du malade.
il la crut même trop peu conséquente pour mériter d'être
traitée par un chirurgien ; il se contenta pour y remédier,
d'appliquer dessus quelques compresses trempées dans leau de
vie, dont il continua seulement l'usage, jusqu'à la
disparition de la douleur, qui arriva quelques jours après,
sans se mettre en peine de ce que deviendroit la tumeur,
sur laquelle le topique n'avoit apporté aucun changement.

Le Malade délivré seulement de sa douleur, ne s'interdisoit
aucuns des exercices attachés à sa place ; il continua de frotter
le parquet, de balayer et manier des corps durs avec sa main
blessée, avec aussi peu de soin que s'il n'y eut eu aucun mal,
et il s'accoutuma si bien à son service, et le fit avec si peu
de ménagement, que bientôt après, on vit la tumeur s'accroître
par des degrés insensibles, et devenir par la suite, considérable.

Cette tumeur indolente qui parut se durcir avec le
tems, et prendre la Caractere ganglioforme, inquietoit
d'autant moins le malade, que l'articulation du doigt —
conservoit assez de mobilité pour lui permettre de le fléchir
et étendre selon les besoins qu'il en avoit: mais l'accroissement
de la tumeur, qui par la suite, parvint au volume du
plus gros œuf de poule, diminua tellement cette mobilité
qu'au mois de février 1763 le doigt ne pouvoit plus se plier.
alors la tumeur devint douloureuse et inquiétante, la tension
et l'inflammation qui s'y joignirent, augmentèrent tellement
la maladie, qu'ils indiquèrent suffisamment la nécessité de
recourir à l'art, pour remédier au désordre et empêcher des
plus grands effets: Mais le malade toujours sourd à la
voix de la nature souffrante, résista encore quelque tems,
et ne se détermina à m'appeller le huit avril puisans
que parce que la tumeur s'étant ouverte d'elle même ce
jour là, il eut des craintes vives pour les suites.

Une matière limpidе et sanieuse, qui étoit l'ouvrage de
l'inflammation, sortit la première par la perforation:
Elle entraîna avec elle sept à huit petits corps blancs d'une
surface très luisante et très polie. Leur figure étoit —



Différentes, les uns presentoient des ellipsoïdes très réguliers et les autres ressembloient parfaitement à des phasoles ou fèves d'haricot. Ils avoient environ trois à quatre lignes de longueur et environ deux de largeur et d'épaisseur; leur texture un peu ferme donnoit des marques d'élasticité: Lorsque je pressois les petits corps avec l'extrémité d'un stylet, loin qu'ils s'écrasassent sous le poids de la compression, ils cédoient seulement en s'applatissant, et se retablissoient très promptement dans leur premier état, dès que je cessois de les comprimer.

La perforation qui leur avoit donné issue, étoit située à la partie interne du doigt, assez près de l'articulation de la première phalange, avec l'os du métacarpe qui la soutient: C'étoit là l'endroit le plus saillant de la tumeur. Je pressai cette tumeur avec mes doigts, il sortit aussitôt de son intérieur, plus d'une douzaine de ces petits corps, qui se succédoient avec autant de rapidité, que le font les semences d'Elaterium lorsqu'on en presse le fruit avant sa parfaite maturité.

Indépendamment des deux matières dont je viens de parler, il s'en presenta encore une troisième dont un flocon engorgé (l'ouverture), je la degageai avec le stylet: sa couleur étoit

blanchâtre, la substance épaisse, et d'une nature absolument semblable, à celle qui constitue les spermatomes, et par conséquent très différente de celle qui formoit les petits corps blancs que je viens de décrire.

J'introduisis ensuite le stylet dans l'intérieur de la tumeur, j'y trouvai une excavation considérable, remplie pour la plus grande partie d'une grande quantité de ces petits corps et le reste par la matière spermatique dont je viens de parler.

Toutes ces matières étoient renfermées dans une espèce de kiste formée par la dilatation graduée de la ~~guaine~~ ^{guaine} ou ligament vaginal, qui recouvre les deux tendons fléchisseurs au devant de la première phalange: et cette dilatation parut occasionnée par l'épanchement aussi gradué d'une grande quantité de matière synoviale qui n'avoit pu être résorbée, à cause de l'obstruction des pores intérieurs de cette partie destinés à cet usage; effet très naturel du froissement de la corde, qui fut comme je l'ai dit plus haut, la première cause de la contusion, de ces parties, et de cette singulière maladie.

Cet examen fut suffisant pour me faire connoître la nature du mal, et pour me faire conclure de la nécessité d'ouvrir la tumeur, d'extraire le kiste, et de remédier au



desordre, qu'une matiere accumulee pendant un laps de tems
aussi long pouvoit avoir produite, afin de parvenir a une
prompte guerison. Je proposai aussi tot l'operation; mais
le malade toujours pusillanime ayant demande quelque tems
pour s'y determiner je ne la fis que deux jours apres, en
presence d'un de mes Confreres qui vouloit bien s'y trouver.

J'ouvris la tumeur dans toute son etendue, parallelement
à la direction du doigt: j'introduisis mon doigt dans la
playe pour en oter toutes les matieres dont la
consistance ne permettoit pas qu'elle sortissent d'elle même.
Je mis par ce moyen les tendons à decouvert, la couleur
jaunatre qu'ils exaltoient me prouva suffisamment leur etat
maladif: j'emportai ensuite les bords de la playe, et
toutes les parties du kiste qu'il me fut possible de separer
de la peau, et je coupai cette capsule le plus pres
de la phalange que je le pus. Par ce procede, je
mis la playe en etat d'être pansée a plat, et je me
fis assez de jour pour pouvoir appliquer sur les tendons
decouverts, les remedes propres à les faire exfolier; je
proposai ensuite l'appareil selon les regles de l'art, pour
ne le lever que quarante-huit heures apres; et je passai

à l'examen des matières que je venois d'extraire, et que j'avois mises agast sur un morceau de linge.

Ces matières, comme je l'ai dit plus haut, Consistoient dans une substance grasse et onctueuse qui ressembloit à du suif et dans une si prodigieuse quantité des petits corps blancs dont j'ai parlé, que je n'en pas la patience de déterminer le nombre: Cependant je les degageai tous de la substance grasse qui les tenoit liés ensemble et qui n'étoit pas la plus abondante; afin d'examiner particulièrement la nature, en les soumettant à des expériences, dont les résultats fussent capables de me la faire connoître.

Je pansai la playe, dans la suite, avec des remèdes propres à exciter la suppuration des portions restantes du kiste, et je procurai peu à peu l'exfoliation des tendons, par les moyens appropriés. Lorsque cette exfoliation, qui fut un peu longue à se faire, fut achevée; la playe se remplit de bonnes chairs, et le malade acheva lui même sa guérison par des pansemens très simples. Néanmoins il resta beaucoup de vider dans le doigt dont la mobilité ne s'est pas encore bien rétablie quoiqu'il y ait deux ans que le malade soit



gueri: Cette difficulté qui depend autant de la —
maladie des tendons, que d'une espece de fausse ankylose
dans les deux premieres articulations de la doigt, auroit
exigé des remedes particuliers, qui auroient pu —
diminuer la roideur de cette jointure, mais il n'a pas
voulu s'y soumettre.

Cette espece de maladie ~~me~~ parut d'autant plus
meriter mon attention, qu'elle presentoit des circonstances
qui en rendoient le fait vraiment interessant: aussi
m'appliquai-je avec soin à en determiner le caractere,
afin d'en donner une description exacte: jusqu'alors je
n'avois encore rien vu de pareil, ni dans la pratique, ni
dans la lecture des auteurs; mais sa singularité m'ayant
obligé de parcourir plusieurs recueils d'observations, pour
voir si je ne rencontrerois rien de semblable ou —
s'approchant; j'ai trouvé dans l'histoire de l'Academie
Royale des Sciences pour l'année 1717 un fait, qui, à
quelques circonstances près, ressemble parfaitement à —
celui qui fait principalement l'objet de la memoire.

Leu Mr. Sivert membre de l'Academie Royale de Chirurgie
à qui on le doit; dit, qu'une femme ayant fait effort

pour lever un grand froid, il parut des le même jour
à la partie inférieure de l'avant bras, une petite tumeur
qui alla toujours en augmentant. Dix huit mois après
il se fit une ouverture à la partie interne de la
main, par ou il sortit du pus et de la ferosite, ce
qui n'empêcha pas la tumeur de grossir encore. Au
bout de deux ans Mr. fivent, ayant ouvert cette tumeur
il en vit sortir d'abord environ deux cuillerées de
ferosité gluante, mêlée d'un peu de pus blanc et très
épais: tout le reste étoit un assemblage d'environ 200
petits corps blancs, ronds et oblongs assez semblables à des
phascoles de quatre lignes de longueur, sans cavités
et tous de même substance. La masse que formoit
cet assemblage étoit recouverte, d'une membrane solide
et si adhérente, qu'on ne put l'en séparer que par la
macération. on observa que ces petits grains avoient
un pedicule, par ou l'on soupçonna qu'ils auroient pu
s'attacher aux parties environnantes; et l'on crut à
l'académie que ces grains étoient des glandes, qui s'étoient
durcies en perdant leur usage naturel; et les filets ou
pedicules furent regardés comme leur canal excrétoire.



La lecture de cette observation, me jeta dans la
perplexité, sur la nature des petits corps blancs que
j'avois trouvés dans la tumeur de mon malade. je ne
sus d'abord si je devois les regarder comme des glandes
sinoviales exfoliées, ou détachées de la surface interne
du ligament vaginal; ou des autres parties sous lesquelles
ils étoient renfermés: ou si je devois croire que ces
petits corps ne fussent qu'un mucilage épaissi dans
l'intérieur du kiste, par un séjour de cinq années, et
granulé ou formé en plusieurs grains, par les différens
mouvements de la main du blessé, et par l'action
successive des corps dans qu'il ne cessoit de manier. Après
plusieurs réflexions je me fixai à ce dernier parti. Car
j'avois peine à croire que les glandes sinoviales se
fussent détachées de la surface des gaines et eussent
acquis un volume aussi considérable, que l'étoit celui de
ces petits corps, relativement au volume ordinaire de ces
organes sécrétoires, lequel comme l'on sait, n'égalé pas
dans l'état naturel, celui d'un très petit grain de millet,
quoique je fusse pourtant très persuadé que les
maladies changent étrangement l'état des choses.

D'ailleurs aucuns deux n'étoient pourvus de petit frot-
ou pedicule, que l'on avoit pris pour le conduit —
excreteur dans le fait donné par moi sivent : au-
contraire j'ai fait remarques que leur surface étoit
partout très unie, et qu'ils n'étoient liés ensemble,
même assez faiblement, ^{que} par une matière grasse qu'il y a
d'une quantité peu considérable, que je presume s'être
séparée de la partie muclagineuse, par l'action
de la même cause, que j'ai dit avoir opérée la
granulation de cette même partie, dont le défaut
d'affinité avec la matière grasse, avoit empêché
qu'ils ne s'incorporassent : mais pour éclaircir mes doutes
à cet égard, j'ai soumis les petits corps aux expériences
suivantes.

Je partageai leur quantité en trois parties égales.
J'en exposai un tiers à l'air libre sur un morceau de
linge, je mis le second tiers dans un petit verre d'eau
claire, et le troisième dans l'esprit de vin.

Au bout de vingt quatre heures, la partie que
j'avois exposée à l'air se durcit considérablement : les petits
corps que j'avois séparés les uns des autres, par des intervalles

suffisans pour empêcher qu'ils ne se touchassent, perdirent leur couleur, leur figure, leur polissure, et les trois quarts de leur volume : j'observai de plus qu'ils s'étoient aplatis, et avoient contractés de très fortes adhérences avec le linge, et que leur couleur naturelle s'étoit changée en une rouffâtre : couleur qu'affectent ordinairement les corps muqueux desséchés.

La partie qui avoit été mise dans l'eau, fut si parfaitement dissoute au deux jours de tems, qu'il n'étoit point aucun vestige : l'eau même où se fit la dissolution, ne se troubla point elle demeura constamment claire et transparente.

Quant à la partie qui fut mise dans l'esprit de vin ; elle se conserva fort longtemps, et ne perdit aucunes de ses propriétés : je remarquai seulement, que les petits corps avoient acquis un peu plus de densité, et un peu moins de volume.

Ces expériences ne parurent suffisantes pour me confirmer dans l'idée où je fus d'abord ; que ces petits corps inorganiques ne devoient être que la substance ~~de~~

Mucilagineuse de la finovie, qui s'étoit amassée, —
épaissie, et granulée, comme je l'ai insinuée cy devant,
tant par le laps de tems, et l'affection malade de
la partie qui renfermoit cette substance; que par
les autres causes que j'ai assignées dans leur lieu; et
non pas des corps glanduleux exfoliés, comme
j'aurois pu l'inférer, d'après l'observation de Mr. Siren
et le jugement de l'Académie. Car il est incontestable
que des glandes étant des corps vasculaires et fibreux,
leur dissolution par la seconde expérience, ne devoit
pas être absolue, il devoit en rester dans l'eau quelques
vestiges. Mais pour rendre mon assertion plus —
concluante j'ai fait encore les expériences suivantes.

Je detachai avec la pointe d'une aiguille, tous les
petits corps qui étoient deséchés sur le linge, et je les
mis dans l'eau; peu de tems après, le fluide s'introduisant
dans leurs pores, les revivifia; et par cette imbibition
ils reprirent, leur forme, leur couleur et leurs autres
propriétés, que le deséchement leur avoit ôtés. Exposés
une seconde fois à l'air; ils se deséchèrent de nouveau;
remis quelques jours après dans l'eau, ils revinrent dans



3° Enfin ; La vertu relâchante de la finovrie —
épanchée, agissant sur les solides à la manière des
corps mucilagineux ; cette vertu ayant encore dans
ce cas, ramolli le ligament vaginal ; elle lui a —
permis de s'étendre sans douleur, au delà des —
bornes prescrites par la nature. /.

Explication de la figure cy jointe

- A. Etendue de la tumeur.
- B. Ouverture qui donna issue aux petits corps.
- C. petits corps sortis de la tumeur dont la figure ressemble
aux phascolos ou fese d'haricot.
- D. autres petits corps ellipsoïdes sortis de la même tumeur.

Par André Marriques maître en
chirurgie à Versailles 1765



C
D



